

RWO – Pflanzenbauempfehlung Winterraps

Fungizid- und Blattdüngungsempfehlung

sehr wüchsige, gesunde Sorten

Carax 0,5 - 0,75 l/ha

Phoma-anfällige Sorten,
Belkar-Anwendungen im Herbst

Tilmor 1,0 - 1,2 l/ha
oder **Toprex 0,4 l/ha**

wüchsige, Phoma-anfällige Sorten (Spritzzfolge)

Toprex
0,3 l/ha

Carax
0,4-0,5 l/ha

zur Förderung des Wurzelwachstums

Tonivit 1l /ha

auf allen Standorten

PHYTAVIS Bor 2,0 - 3,0 l/ha
150 g/l Bor

auf humosen Standorten / Mangelstandorten

+ YaraVita Raps Pro 3,0 l/ha
69 g/l N, 125 g/l Ca, 60 g/l Bor, 118 g/l MgO,
70 g/l Mn, 4 g/l Mo

Graminizid- und Insektizidempfehlung

Schädlinge (Erdfloh, etc.)
beim Erreichen der Schadschwelle
(siehe auch Kapitel Schädlinge)

Karate Zeon 75 ml/ha

Ausfallgetreide

Fusilade 1 l/ha

fop-resistenter Ackerfuchsschwanz
+ Ausfallgetreide

Focus Aktiv Pack
Focus Ultra 2,5 l/ha + Dash 2,5 l/ha

fop-resistenter Ackerfuchsschwanz
(keine ausreichende Wirkung auf Ausfallgetreide;
bei Bedarf z. B. 0,4 l/ha Agil-S ergänzen)

Select 240 EC
Select 240 EC 0,5 l/ha
+ Radiamix 1,0 l/ha

Keine Mischung mit Fungiziden
Letzter Einsatztermin erste Oktober-Woche


Spätherbst Vegetationsruhe

gegen res. AFU:

Kerb FLO 1,875 l/ha
oder **Milestone 1,5 l/ha**
(auch bei hohem Trespenbesatz)

Problemverungrasung:

Gräserbekämpfung unter Berücksichtigung des
Resistenzmanagements durch Wirkstoffwechsel
(effektiver Einsatz von Zellwachstumshemmern)



RWO – Pflanzenbauempfehlung Wintergetreide

Windhalm- und Unkrautbekämpfung

Windhalm, E. Rispe
+ breite Mischverunkrautung

Falkon + Sunfire
0,75 + 0,25 l/ha
(länderspez. Gewässer-Mindestabstand)

Ergänzung bei Bedarf:
Zusatzwirkung auf Kamille,
Kornblume, Windhalm, Kerbel,
Rispe

Windhalm, E. Rispe
+ breite Mischverunkrautung

Herold SC¹
0,4 l/ha
oder
Mateno Duo + Cadou SC
0,35 + 0,25 l/ha

+ **PHYTAVIS CTU 700***
1,0-1,5 l/ha

VA

leichte Roggenstandorte >>

Boxer** 2,0 l/ha

1 = Zulassung beachten: Triticale nur NA


* CTU Auflagen beachten

Keine Anwendung:

- auf drainierten Flächen
- auf Sandböden mit einem C-org.-Gehalt kleiner 1,5 %
- Positivliste Weizensorten beachten
- Keine weiteren CTU Produkte innerhalb eines Kalenderjahres

** Auflagen bei Ausbringung beachten

- Mit mind. 300 l/ha Wasser
- mit 90% Abdriftminderung auf der ges. Fläche
- bei max. 7,5 Km/h Fahrgeschwindigkeit
- bei max. 3 m/s Wind



Bekämpfung in Spritzfolgen ist optimal.
Erste Maßnahme möglichst im VA des AFU platzieren.

Ackerfuchsschwanz- und Unkrautbekämpfung in Wintergerste

Ackerfuchsschwanz + Windhalm + Rispe

inkl. breite Mischverunkrautung

Boxer + Cadou SC**
2,5 l + 0,5 l/ha
(Länderspezifischer Gewässer-Mindestabstand)

Herold SC 0,6 l/ha

oder
Pontos + Quirinus
0,5 l + 0,5 l/ha

Herbstanwendung bei aufgelaufenem Ackerfuchsschwanz (1-2 Blätter)

Axial 50 EC
0,9 l/ha (Herbst) oder
1,2 l/ha (Frühjahr)

VS

Roundup PowerFlex
2 l/ha

1-2 Tage vor der
Saatbettbereitung

Problemstandorte:

Boxer: Ergänzung zu Herold / P. + Q. zur weiteren Wirkungsverbesserung bei feuchten Böden

im VA

+

Boxer** 2,0 l/ha

oder **Trinity**** 2,0 l/ha

NA

Nachlage in den Auflauf

- ** Auflagen bei Ausbringung beachten
- Mit mind. 300 l/ha Wasser
 - mit 90% Abdriftminderung auf der ges. Fläche
 - bei max. 7,5 Km/h Fahrgeschwindigkeit
 - bei max. 3 m/s Wind

