Wintergerste

Ackerfuchsschwanzstandorte

Vegetationsbeginn | **Vegetation**

Anwendung bei Frost möglich!

Ackerfuchsschwanz (früh)
Weidelgras (früh)
Flughafer (in der Vegetation)

Axial 50
1,2 l/ha

frühe Axial-Behandlungen erhöhen den Wirkungsgrad

Spritzfolge →

Omnera
0,9 l/ha - 1,0 l/ha

oder

Potacur
50 g/ha

Vitalisierung

All-In
2 l/ha

\+ Mangan
1 l/ha

\+ Combitop
5 kg/ha

Eine Blattdüngung 7 Tage ***nach*** der Pacifica Behandlung kann die Verträglichkeit der Maßnahme verbessern.

Winterweichweizen

Ackerfuchsschwanzstandorte

Behandlung auf drainierten Flächen erst nach dem 15. März

inkl. Kamille, Klettenlabkraut

Pacifica Plus * + Biopower (FHS)
500 g/ha + 1,0 l/ha
+ AHL 30 l/ha (oder SSA 10 kg)

500 g/ha Pacifica Plus entspricht
500 g/ha Atlantis WG + ca. 200 g/ha Hoestar Super

Spritzfolge →

* Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich

keine Anwendung von Mesosulfuron-haltigen Produkten bei:
- niedriger rel. Luftfeuchtigkeit (< 65%), Kälte, Wachstumsstillstand
- durch Frost oder durch Staunässe geschwächte Bestände

Winterweichweizen, Wintertriticale und Winterroggen

Windhalmstandorte

Windhalm und
breite Mischverunkrautung,
inkl. Ehrenpreis, resistente Kamille,
Klettenlabkraut, Kornblume, Stiefmütterchen,
Storchschnabel

AGRAVIS Broadway Perfect Pack
160 g/ha + 160 ml/ha + 0,8 l/ha
(Senior + Primus Perfect + FHS)

BBCH 13 | **BBCH 21** | **BBCH 25** | **BBCH 29**

Winterweichweizen und Wintertriticale

Ackerfuchsschwanzstandorte (+ Trespe)

Vegetationsbeginn

keine Anwendung von Mesosulfuron-haltigen Produkten bei:
- niedriger rel. Luftfeuchtigkeit (< 65%), Kälte, Wachstumsstillstand
- durch Frost oder durch Staunässe geschwächte Bestände

Atlantis Flex* + Biopower (FHS)
330 g/ha + 1,0 l/ha
+ AHL 30 l/ha (oder SSA 10 kg)

(+)

inkl. **Kamille,** Ehrenpreis, etc.

Biathlon 4D + Dash E.C.
70 g/ha + 1,0 l/ha

(bei Tankmischungen mit Atlantis Flex entweder Dash oder AHL)

* =
- keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01.11. und 15.03.,
- Schäden an nachgebauten zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten und Winterraps möglich
- Reihenfolge beim Ansetzen der Spritzbrühe beachten (siehe Folie „Erstellung von Tankmischungen“)

BBCH 13

BBCH 21

ACHTUNG

Bitte achten Sie darauf nach der Anwendung von Pacifica Plus, Broadway Perfect Pack, Atlantis Flex oder andere Sulfonyl-haltigen Produkten die Pflanzenschutz-Spritze gründlich mit Reiniger zu reinigen, um FOLGESCHÄDEN an Raps und Gerste zu VERMEIDEN!

Erstellung von Tankmischungen

1. Grundsätzliche Vorgehensweise

Richtige Reihenfolge der Mischpartner in Wasser

A. Feste Stoffe (Granulate)
1. Feste Düngemittel
2. WG-, SG-, SP- und WP-(Pulver)-Formulierungen

B. Feste Partikel in flüssigem Produkt
3. SC-, SE- und CS-Formulierungen

C. Bereits gelöste Wirkstoffe
4. SL- und OD Formulierungen
5. Formulierungshilfsstoffe (Ausnahmen bei AHL)
6. EW- und EC Formulierungen
7. Flüssigdünger/Spurennährstoffe

Weitere Hinweise:
Dash immer zuletzt in den Tank

2. Reihenfolge bei Atlantis Flex/Pacifica Plus

Wasser etwas Vorsprung geben ► Spritze ⅓ bis ½ mit Wasser füllen	pH-Puffer Neutraler Pool
+ Atlantis Komponente A (Flex)	Sulfonyl-harnstoff(e)
+ Atlantis Komponente B	ansäuern
+ 10 kg/ha SSA oder 30 l/ha AHL + evtl. weitere Additive/FHS	pH neutral, Kleber, Nachlieferer