



## Empfehlung Mais-Herbizide 2018

### Standorte mit breiter Mischverunkrautung

Nachtschatten, Weißer Gänsefuß, Melde,  
Hühnerhirse, Kamille, Knöterich-Arten,  
Jährige Rispe

**Calaris forte**  
Calaris + Milagro forte extra Peak \*  
1,0 l + 0,5 l + 20 g/ha

Hühnerhirse, Grüne Borstenhirse,  
Weißer Gänsefuß, Melde, Nachtschatten  
Kamille, Knöterich-Arten, Jährige Rispe

**Elumis Gold**  
Elumis \* + Gardo Gold  
1,25 l + 2,5 l/ha

Ackerfuchsschwanz, Quirlige Borstenhirse,  
Hühnerhirse, Quecke, Tresse, Jährige Rispe,  
Knöterich-Arten, Weißer Gänsefuß, Kamille

**MaisTer power Aspect Pack**  
MaisTer power \* + Aspect  
1,25-1,5 l + 1,25-1,5 l/ha

#### Altverunkrautung

**Roundup Powerflex \*\***  
3,75 l/ha

\* Sortenverträglichkeit und Zulassung beachten !

\*\* Bis 2 Tage vor der Saat oder bis max. 5 Tage nach  
der Saat (BBCH 03, Keimwurzel nicht ausgetreten)

BBCH 00 05 11 12 13 14

© BBCH-Stadien Bayer CropScience

### Standorte mit Hühnerhirse und breiter Mischverunkrautung

Spritzfolge bei ungünstigen  
Witterungsbedingungen oder  
verzetteltem Auflauf der Hirsen  
und Unkräuter  
(insbes. Frühsaaten)

**ACDC + Buctril**  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
0,75 l + 0,75 l + 0,2 l/ha

**Laudis + Spectrum Gold**  
+ PHYTAVIS Scooter  
1,0 l + 1,0 l + 0,2 l/ha

Hühnerhirse, Borstenhirse,  
Kamille, Knöterich-Arten,  
Nachtschatten,  
Mischverunkrautung

**Laudis Aspect Pack + Buctril**  
Laudis + Aspect + Buctril  
2,0 l + 1,5 l + 0,3 l/ha

Große Hühnerhirse, Borstenhirse,  
Gräser, Nachtschatten, Kamille,  
Knöterich-Arten, Mischverunkrautung

**ACDC forte**  
Calaris + Dual Gold + Milagro forte extra Peak \*  
1,0 l + 1,0 l + 0,5 l + 20 g/ha

+ Melde und Gänsefuß

+ PHYTAVIS Scooter 0,2 l/ha

\* Sortenverträglichkeit und  
Zulassung beachten !

BBCH 00 05 11 12 13 14

© BBCH-Stadien Bayer CropScience

## Problemstandorte in engen Fruchtfolgen mit Borstenhirse und Faden-Fingerhirse

### Sulfonylfreie Lösung:

Hühnerhirse, Borstenhirse, Faden-Fingerhirse,  
Nachtschatten, Kamille, Mischverunkrautung  
(bessere Wirkungsgrade durch Anwendung im Splitting)

### Laudis + Spectrum Gold

+ PHYTAVIS Scooter  
2,0 l + 2,0 l + 0,3 l/ha

Spritzfolge bei günstigen  
Witterungsbedingungen,  
aber verzögertem Auflauf der  
Borstenhirsen und Gräser,  
Quecke

### ACDC + Buctril

Calaris + Dual Gold + Buctril  
1,0 l + 1,0 l + 0,2 l/ha

Milagro forte extra Peak \*  
0,5 l + 20 g/ha


Nicosulfuronfreie Spritzfolge:  
keine Anwendung von Mitteln  
mit dem Wirkstoff Nicosulfuron,  
wenn im Vorjahr auf der selben  
Fläche Nicosulfuron eingesetzt  
wurde

MaisTer power \*  
1,25 l/ha

oder

Cato \* + FHS + Buctril  
40 g + 0,24 l + 0,2 l/ha

\* Sortenverträglichkeit und  
Zulassung beachten !



## Standorte mit breiter Mischverunkrautung und Ackerwinde / Zaunwinde

(Spritzfolge!)

### 1. Spritzung

### 2. Spritzung

#### Mischverunkrautung

+ Nachtschatten  
+ Hühnerhirse  
+ Jährige Rispe  
+ Windenknöterich

ACDC + Buctril  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
1,0 l + 1,0 l + 0,3 l/ha

Acker- u. Zaunwinde,  
Gräser, Knöterich-Arten

Milagro forte extra Peak \*  
0,5 l + 20 g/ha

#### Mischverunkrautung

+ Jährige Rispe  
+ alle Hirsearten


Laudis + Spectrum Gold  
+ Buctril  
2,0 l + 2,0 l + 0,3 l/ha

Acker- u. Zaunwinde,  
Knöterich-Arten, Kamille

Casper Plus  
Casper \*\* + HERBAspread CS  
0,25 kg + 0,25 l/ha

\* Sortenverträglichkeit und  
Zulassung beachten !

\*\* Temperaturen: am Tag > 20-28° C  
nachts > 12° C



## Standorte mit breiter Mischverunkrautung und Kartoffeldurchwuchs

(Spritzfolge!)

### 1. Spritzung

### 2. Spritzung

#### Mischverunkrautung

+ Nachtschatten  
+ Hühnerhirse  
+ Jährige Rispe  
+ Windenknöterich  
+ Ausfallkartoffeln

ACDC + Buctril  
Calaris + Dual Gold + Buctril  
1,25 l + 1,25 l + 0,3 l/ha

Nachlage gegen Kartoffeln

Callisto + PHYTAVIS Scooter  
1,5 l + 0,3 l/ha

